

Таблица 1

	1-ая группа		2-ая группа		3-я группа	
	n=1338		n=1110		n=2790	
Норма	816	60,99%	750	67,57%	2238	80,22%
Умеренные нарушения	270	20,18%	276	24,86%	528	18,92%
Выраженные нарушения	252	18,83%	84	7,57%	24	0,86%

Таблица 2

Симптомы	Учащенное мочеиспускание	Редкие мочеиспускания	Нарушения частоты мочеиспускания	Ноктурия	Энурез	Нерешительность	Прерывистая струя	Ургентность	Дизурия	Неполное опорожнение
	196	118	314	168	306	180	216	312	126	126
	14,65%	8,82%	23,47%	12,56%	22,87%	13,45%	16,14%	23,32%	9,42%	9,42%
	162	122	284	138	138	102	162	162	78	144
	14,59%	10,99%	25,59%	12,43%	12,43%	9,19%	14,59%	14,59%	7,03%	12,97%
	104	284	388	228	54	228	132	216	150	228
	3,73%	10,18%	13,91%	8,17%	1,94%	8,17%	4,73%	7,74%	5,38%	8,17%

Таблица 3

	Девочки		Мальчики	
	n=2544		n=2694	
Норма	1890	74,29%	1914	71,05%
Умеренные нарушения	510	20,05%	564	20,94%
Выраженные нарушения	144	5,66%	216	8,02%

Источник:

Методы и результаты урологических обследований детей Октябрьского округа Омска в условиях детской поликлиники в 2011-2012 годах

Алёшин И.В., Зайцев Ю.Е., Чебыкина И.Е., Дмитриева В.Е.

БУЗОО "Детская городская поликлиника No 5", г. Омск

<http://disuria.ru/>