Таблица 1

## Динамика изменения параметров мочеиспусканий у больных по группам до и после лечения

| Сроки / Параметры | Исходные данные | | Через 8 недель | | Через 24 недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Контрольная группа | Исследуемая группа | Контрольная группа | Исследуемая группа | Контрольная группа | Исследуемая группа |
| Бальная квалиметрическая оценка | 17,5 ± 4,98 | 16,62 ± 5,33 | 14,25 ± 4,20 | 9,96 ± 3,19 | 9,1 ± 2,81 | 6,81 ± 2,19 |
| Количество мочеиспусканий в сутки | 15,45 ± 4,45 * | 15,08 ± 4,77 # | 11,35 ± 3,22 * | 9,35 ± 2,78 # | 8,55 ± 2,06 * | 8,17 ± 2,5 # |
| Эффективный объем мочевого пузыря (мл) | 68,95 ± 20,01 * | 74,65 ± 24,98 # | 81,24 ± 23,51 * | 104,08 ± 34,1 # | 104,95 ± 29,15 * | 126,91 ± 42,43 # |
| Количество эпизодов энуреза в неделю | 7,8 ± 4,2 | 7,92 ± 5,26 | 4,9 ± 3,01 | 4,54 ± 3,72 | 1,85 ± 1,93 | 1,77 ± 2,14 |
| Частота императивных позывов (0 баллов – отсутствие, 3 балла – постоянно) | 2,15 ± 0,81 | 2,0 ± 0,69 | 1,75 ± 0,79 | 0,81 ± 0,75 | 1,4 ± 0,68 | 0,23 ± 0,43 |
| Средняя скорость мочеиспускания (мл/сек) | 15,58 ± 3,16 ** | 17,35 ± 3,9 ## | 13,8 ± 2,15 ** | 12,78 ± 2,91 ## | 11,94 ± 2,41 ** | 11,75 ± 2,62 ## |

Достоверность различий между показателями:

- до лечения: * – $p < 0,01$, ** – $p < 0,001$;
- после лечения: # – $p < 0,01$, ## – $p < 0,001$

Источник:
Эффективность препарата Адаптол при лечении гиперактивного мочевого пузыря у детей
Алёшин И.В., к.м.н. Зайцев Ю.Е., БУЗОО "Детская городская поликлиника № 5", г. Омск
http://disuria.ru/