

**Динамика изменения параметров мочеиспусканий у больных по группам до и после лечения**

Сроки Параметры	Исходные данные		Через 8 недель		Через 24 недели	
	Контрольная группа	Исследуемая группа	Контрольная группа	Исследуемая группа	Контрольная группа	Исследуемая группа
Бальная квалитетрическая оценка	12,73 ± 9,01	11,62 ± 9,52	9 ± 6,32	8,04 ± 5,93	10,5 ± 5,89	7,42 ± 5,35
Количество мочеиспусканий в сутки	10,82 ± 5,79	10,42 ± 5,96	7,45 ± 4,09	7,35 ± 3,91	8,32 ± 4,29	7,12 ± 3,32
Эффективный объём мочевого пузыря (мл)	65,14 ± 19,94 *	71,54 ± 23,84 #	79,18 ± 23,57 *	95,65 ± 33,56 #	77,05 ± 24,31 *	104,54 ± 34,48 #
Количество эпизодов энуреза в неделю	3,98 ± 5,19	3,91 ± 4,75	2,68 ± 3,66	2,55 ± 2,99	3,08 ± 3,52	2,09 ± 2,88
Максимальная скорость мочеиспускания (мл/сек)	53,27 ± 12,53 **	58,46 ± 11,02 ##	37,77 ± 9,21 **	37,08 ± 10,18 ##	37,23 ± 8,86 **	31,08 ± 8,08 ##
Средняя скорость мочеиспускания (мл/сек)	16,55 ± 2,76 **	17,12 ± 3,69 ##	11,18 ± 1,99 **	11,15 ± 2,39 ##	10,73 ± 2,1 **	9,5 ± 1,61 ##

Достоверность различий между показателями:

- до лечения: \* –  $p < 0,01$ , \*\* –  $p < 0,001$ ;
- после лечения: # –  $p < 0,01$ , ## –  $p < 0,001$

Источник:

Эффективность препарата Пантогам в комплексной терапии больных с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря  
Алешин И.В., к.м.н. Зайцев Ю.Е., БУЗОО "Детская городская поликлиника № 5", г. Омск

<http://disuria.ru/>